



QUY TRÌNH Bộ sản phẩm CODA

Trên cây Thanh long



Giai đoạn 1: **LÀM ĐẤT**

- Trước khi xuống giống 15-30 ngày cần làm đất để bổ sung chất dinh dưỡng là tiền đề cơ bản để cây phát triển tốt hơn.
- Luân phiên sử dụng **CODASAL PREMIUM** (1) với liều lượng 5 lít pha với 2000 lít nước (10 phuy)/ ha.



Giai đoạn 2: NĂM THỨ NHẤT, THỨ HAI, THỨ BA

- Ở các giai đoạn này, cây cần cung cấp hàm lượng đạm cao để phát triển cành nhánh, ra rễ nhiều và bón tăng dần 20% lượng phân bón qua từng năm.
- Sử dụng **CODASAL PREMIUM** (1) + **DALGIN Mg** (2) với liều lượng 1 lít pha 720 lít nước (4 phuy).
- Sử dụng **CODAVIT** (3) với liều lượng 1 lít pha với 400 lít nước (2 phuy), phun 2 lần vào đầu mùa mưa và cuối mùa mưa, thời điểm này độ ẩm cao dễ dẫn đến các nấm bệnh phát triển mạnh. Sử dụng **CODAVIT** (3) thường xuyên để phòng trừ các bệnh do nấm gây ra.
- Kết hợp **CODAMIX** (4) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước (4 phuy) phun 5 lít/cây, 7 ngày phun 1 lần.



Giai đoạn 3: GIAI ĐOẠN 15 NGÀY TRƯỚC KHI THẮP ĐÈN (CHUẨN BỊ XỬ LÝ RA HOA)

- Ở giai đoạn này cần hàm lượng lân và kali cao để giúp cho lá nhanh thành thực và kích thích các mầm ngủ ở trên cây để phân hóa mầm hoa và kích thích ra hoa.
- Sử dụng **CODAFOL K** (1) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước (4 phuy) phun đều ướt hết lá cây, phun 2 lần mỗi lần cách 7-10 ngày, sẽ giúp cây phân hóa mầm hoa nhanh hơn, nụ hoa to, mập.
- Cần thường xuyên sử dụng **CODAMIX** (2) + **CODAVIT** (3) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng cho cây và phòng ngừa nấm bệnh.



1

2

3



Giai đoạn 4: GIAI ĐOẠN 3-5 NGÀY SAU KHI NGỪNG ĐÈN (GIAI ĐOẠN NUÔI HOA)


- Ở giai đoạn này cần nuôi hoa, cây cần các nguyên tố trung vi lượng để tăng khả năng đậu trái.
- Sử dụng **CODAMIN B-MO** (1) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước (4 phuy) phun 4 lần, mỗi lần cách nhau 10 ngày.
- Cần thường xuyên sử dụng **CODAMIX** (2) + **CODAVIT** (3) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng cho cây và phòng ngừa nấm bệnh.



1

2

3



Giai đoạn 5: GIAI ĐOẠN 45-50 NGÀY SAU KHI NGỪNG ĐÈN (NUÔI TRÁI NON)

- Giai đoạn này cây cần hàm lượng đạm và kali cao để giúp nuôi trái và tăng độ ngọt, màu sắc cho trái.
- Sử dụng **CODAMIN B-MO** (1) + **DALGIN MG** (2) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước (4 phuy) phun 4 lần, mỗi lần cách nhau 10 ngày.
- Cần bổ sung **CODAMIX** (3) + **CODASAL PREMIUM** (4) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng cho cây và phòng ngừa nấm bệnh.



Giai đoạn 5: GIAI ĐOẠN 45-50 NGÀY SAU KHI NGỪNG ĐÈN (NUÔI TRÁI LỚN)

- Giai đoạn này cây cần hàm lượng đạm và kali cao để giúp nuôi trái và tăng độ ngọt, màu sắc cho trái.
- Sử dụng **CODAFOL K** (1) + **CODASAL PREMIUM** (2) với liều lượng 1 lít pha 720 lít nước, phun 2 lần mỗi lần cách nhau 10 ngày, để giúp tăng màu sắc cho trái, cuống dài, vỏ cứng tránh tình trạng rụng trái, nứt trái M2.
- Cần thường xuyên sử dụng **CODAMIX** (3) + **CODAVIT** (4) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng cho cây và phòng ngừa nấm bệnh.



Giai đoạn 6: GIAI ĐOẠN SAU KHI KẾT THÚC VỤ NGHỊCH (THU HOẠCH)

- Giai đoạn này cây vừa mới bị mất sức do mới làm vụ nghịch xong nên cần hàm lượng đạm cao để giúp cây phục hồi lại và tiếp tục làm vụ chính.
- Rửa vườn: Sử dụng **CODAVIT** (1) với liều lượng 1 lít pha 400 lít nước.
- Bón lá sử dụng **NUMASTAR** (2) + **DALGIN Mg** (3) với liều lượng 1 lít pha 400 lít nước , phun 2 lần mỗi lần cách nhau 7 ngày.



Giai đoạn 7: GIAI ĐOẠN TRƯỚC KHI CÂY RA HOA 15 NGÀY (XỬ LÝ RA HOA)

- Giai đoạn này, cây cần hàm lượng lân và kali cao để giúp co lá nhanh thành thực và kích thích các mầm ngủ ở trên cây để phân hóa mầm hoa và kích thích ra hoa.
- Sử dụng **CODAFOL K** (1) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước (4 phuy) phun đều ướt hết lá cây phun 2 lần mỗi lần cách 7-10 ngày, sẽ giúp cây phân hóa mầm hoa nhanh hơn, nụ hoa to, mập.
- Cần thường xuyên sử dụng **CODAMIX** (2) + **CODAVIT** (3) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng cho cây và phòng ngừa nấm bệnh.



1

2

3



Giai đoạn 8: GIAI ĐOẠN KHI CÂY ĐÃ CÓ NỤ HOA

- Giai đoạn này cây cần các nguyên tố trung vi lượng để tăng khả năng đậu trái.
- Sử dụng **CODAMIN B-MO** (1) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước (4 phuy) phun 4 lần, mỗi lần cách nhau 10 ngày.
- Cần thường xuyên sử dụng **CODAMIX** (2) + **CODAVIT** (3) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng cho cây và phòng ngừa nấm bệnh.



1

2

3



Giai đoạn 9: GIAI ĐOẠN 45-50 NGÀY SAU KHI CÓ NỤ HOA (NUÔI TRÁI NON)

- Giai đoạn này cây cần hàm lượng đạm và kali cao để giúp nuôi trái và tăng độ ngọt, màu sắc cho trái.
- Sử dụng **CODAMIN B-MO** (1) + **DALGIN Mg** (2) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước (4 phuy) phun 4 lần, mỗi lần cách nhau 10 ngày.
- Cần bổ sung **CODAMIX** (3) + **CODASAL PREMIUM** (4) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng cho cây và phòng ngừa nấm bệnh.



1

2

3

4



Giai đoạn 9: GIAI ĐOẠN 45-50 NGÀY SAU KHI CÓ NỤ HOA (NUÔI TRÁI LỚN)

- Giai đoạn này cây cần hàm lượng đạm và kali cao để giúp nuôi trái và tăng độ ngọt, màu sắc cho trái.
- Sử dụng **CODAFOL K** (1) + **CODASAL PREMIUM** (2) với liều lượng 1 lít pha 720 lít nước, phun 2 lần mỗi lần cách nhau 10 ngày, để giúp tăng màu sắc cho trái, cuống dài, vỏ cứng tránh tình trạng rụng trái, nứt trái M2.
- Cần thường xuyên sử dụng **CODAMIX** (3) + **CODAVIT** (4) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng cho cây và phòng ngừa nấm bệnh.



1

2

3

4



Giai đoạn 10: GIAI ĐOẠN RỬA VƯỜN VÀ PHỤC HỒI SAU THU HOẠCH

1. Giai đoạn rửa vườn:

Giai đoạn này cây vừa mới bị mất sức do mới làm vụ nghịch và vụ chính xong nên cần hàm lượng đạm cao để giúp cây phục hồi lại và tiếp tục làm vụ mới.

- Rửa vườn: Sử dụng **CODAVIT** (1) với liều lượng 1 lít pha 400 lít nước.

2. Giai đoạn phục hồi sau thu hoạch:

- Sử dụng **NUMASTAR** (2) + **DALGIN Mg** (3) với liều lượng 1 lít pha 400 lít nước, phun 3 lần mỗi lần cách nhau 7-10 ngày giúp cải tạo đất, phục hồi cây sau thu hoạch và tăng quang hợp cho cây.



1

2

3

