SENTRA

QUY TRÌNH
Bộ sản phẩm CODA
Trên cây Cà phê

Giai đoạn 1: LÀM ĐẤT

Đất trồng phải là đất tốt, tầng đất dày, tơi xốp, dễ thoát nước, giàu dinh dưỡng. Nếu phải trồng lại trên chu kỳ trước đã trồng tưới ***CODASAL PREMIUM*** (1) với liều lượng 5 lít pha với 2000 lít nước (10 phuy)/ ha để cải tạo đất.

Giai đoạn 2: NĂM THỨ NHẤT, THỨ HAI, THỨ BA

- Ở các giai đoạn này, cây cần cung cấp hàm lượng đạm cao để phát triển cành nhánh, ra rễ nhiều và bón tăng dần 20% lượng phân bón qua từng năm.
- Sử dụng ***CODASAL PREMIUM*** (1) + ***DALGIN Mg*** (2) với liều lượng 1 lít pha 720 lít nước (4 phuy).
- Kết hợp ***CODAMIX*** (3) với liều lượng 1 lít pha với 400 lít nước (2 phuy) phun 5 lít/cây, 7 ngày 1 lần để giúp cây cơi đọt.
- Sử dụng ***CODAVIT*** (4) với liều lượng 5 lít pha với 2000 lít nước (10 phuy)/ha, phun định kỳ 1 tháng 1 lần cùng với phân bón để phòng ngừa nấm bệnh.

1 2 3 4

Giai đoạn 3: CHUẨN BỊ RA HOA

- Sử dụng ***CODAFOL K*** (1) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để kích thích ra mầm hoa và là tiền đề tăng chất lượng hạt cà phê sau này
- Cần thường xuyên sử dụng ***CODAMIX*** (2) + ***CODAVIT*** (3) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng và phòng ngừa nấm bệnh cho cây.

1 2 3

Giai đoạn 4: KÍCH THÍCH THỤ PHẤN (NUÔI HOA)

- Sử dụng ***CODAMIN B-MO*** (1) với liều lượng 5 lít pha với 2000 lít nước (10 phuy)/ha, phun đều ướt hết lá, phun 2 lần mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.

Lưu ý:

*- Ở giai đoạn này cần xiết nước thì cây mới ra hoa, xiết nước trong vòng 10-15 ngày cây sẽ ra hoa, cần bổ sung **NUMASTAR** (2) để duy trì độ ẩm cho đất và cây, hạn chế tình trạng ra hoa muộn. Sau đó tiếp tục phun để làm bông.*

*- Cần thường xuyên sử dụng **CODAMIX** (3) + **CODAVIT** (4) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng và phòng ngừa nấm bệnh cho cây.*

1 2 3 4

Giai đoạn 5: GIAI ĐOẠN NGỦ (NUÔI TRÁI NON)

Sau khi cây tự thụ phấn, quả cà phê lúc này đã hình thành với kích thước nhỏ và rơi vào trạng thái ngủ, thời gian kéo dài từ 6-10 ngày.

- Ở giai đoạn này cần sử dụng ***CODAMIN B-MO*** (1) + ***DALGIN Mg*** (2) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước bổ sung đủ nước cho cây để rút ngắn thời gian ngủ của cây cà phê.
- Cần thường xuyên sử dụng ***CODAMIX*** (3) + ***CODAVIT*** (4) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng và phòng ngừa nấm bệnh cho cây.
- Sử dụng bổ sung ***CODASAL PREMIUM*** (5) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để cung cấp dinh dưỡng cho rễ phát triển tốt.

1 2 3 4 5

Giai đoạn 6: GIAI ĐOẠN TĂNG KÍCH THƯỚC (NUÔI TRÁI LỚN)

Sau khi cây cà phê đã hút đủ lượng nước cần thiết sẽ bước vào giai đoạn tăng kích thước kéo dài khoảng 8-10 tuần. Giai đoạn này quyết định kích thước của hạt cà phê nên cần bổ sung đầy đủ trung vi lượng để cây phát triển tốt nhất. Nên sử dụng ***CODAMIX*** (1) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước.

- Sử dụng ***CODAMIN B-MO*** (2) + ***CODAFOL K*** (3) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước (4 phuy) phun 2 lần mỗi lần cách nhau 10 ngày
- Ở giai đoạn này cần xiết nước thì cây mới ra hoa, xiết nước trong vòng 10-15 ngày cây sẽ ra hoa, cần bổ sung ***CODASAL PREMIUM*** (4) để duy trì độ ẩm cho đất và cây hạn chế tình trạng ra hoa muộn. Sau đó tiếp tục phun để làm bông để làm hoa.

1 2 3 4

Giai đoạn 7: GIAI ĐOẠN KINH DOANH (GIAI ĐOẠN VÀO NHÂN)

- Ở giai đoạn này cây cần dinh dưỡng cân bằng để tập trung tăng kích thước hạt cà phê mang chất lượng cao.
- Sử dụng ***CODAFOL K*** (1) với liều lượng 1 lít pha 400 lít nước , cách 15 ngày phun 1 lần.
- Cần thường xuyên sử dụng ***CODAMIX*** (2) + ***CODAVIT*** (3) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng và phòng ngừa nấm bệnh cho cây.
- Sử dụng bổ sung ***CODASAL PREMIUM*** (4) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để cung cấp dinh dưỡng cho rễ phát triển tốt.

1 2 3 4

Giai đoạn 8: 20 NGÀY TRƯỚC THU HOẠCH (GIAI ĐOẠN HẠT CHÍN)

- Giai đoạn này cây cần hàm lượng kali cao để giúp tăng màu sắc, độ cứng vỏ của trái cà phê
- Tăng cường sử dụng ***CODAFOL K*** (1) với liều lượng 1 lít pha 400 lít nước (2 phuy) 7 ngày 1 lần.

Lưu ý: *Ở giai đoạn này tránh sử dụng các thuốc BVTV có độ bám dính cao vì sẽ ảnh hưởng đến màu sắc và hương vị,... Có thể sử dụng* ***CODAVIT*** *(2) để thay thế và phòng trừ nấm bệnh (đặc biệt vào mùa mưa)*

1 2

Giai đoạn 9: RỬA VƯỜN, CẢI TẠO ĐẤT VÀ PHỤC HỒI SAU THU HOẠCH

1. Giai đoạn rửa vườn:

- Sử dụng ***CODAVIT*** (1) với liều lượng 5 lít pha với 2000 lít nước (10 phuy)/ha phun ướt đều cây từ gốc tới ngọn.

2. Giai đoạn cải tạo đất và phục hồi sau thu hoạch

- Ở giai đoạn này sau khi thu hoạch xong cây đang bị mất sức nên cần các nguyên tố đa lượng cao và hữu cơ để giúp cải thiện đất và dưỡng lại bộ rễ.
- Sau khi rửa vườn xong 7 ngày bón sử dụng luân phiên ***NUMASTAR*** (2) và ***CODASAL PREMIUM*** (3) kết hợp với ***DALGIN Mg*** (4) với liều lượng 5 lít pha với 2000 lít nước (10 phuy)/ha, 7 ngày phun 1 lần.

Lưu ý: *Giai đoạn này có thể sử dụng kết hợp thêm các thuốc BVTV.*

1 2 3 4