




# Quy trình Phân bón SENTRA

Trên cây Sầu riêng



# Giai đoạn 1: LÀM ĐẤT

- Trước khi xuống giống 15-30 ngày cần làm đất để bổ sung chất dinh dưỡng và là tiền đề cơ bản để cây phát triển tốt hơn.
- Sử dụng các loại **PHÂN BÓN HỮU CƠ** (1) với liều lượng 250kg/ha kết hợp rải **BOOSTFERT HUMIC K** (2) với liều lượng 30kg/ha + tưới **CODASAL PREMIUM** (3) với liều lượng 5 lít pha với 2000 lít nước (10 phuy)/ ha. Kết hợp với **BOOSTFERT NP 25-20** (4) với liều lượng 250kg/ha.



1

2

3

4





## Giai đoạn 2: NĂM THỨ NHẤT, THỨ HAI, THỨ BA

- Ở các giai đoạn này, cây cần cung cấp hàm lượng đạm cao để phát triển cành nhánh, ra rễ nhiều và bón tăng dần 20% lượng **PHÂN BÓN HỮU CƠ** (1) qua từng năm.
- Sử dụng **SENTRA NPK 30-9-9+TE** (2) rải gốc với liều lượng 2kg/cây chia ra 4 lần bón trên 1 năm kết hợp **CODASAL PREMIUM** (3) + **DALGIN Mg** (4) với liều lượng 1 lít pha 720 lít nước (4 phuy).
- Kết hợp **CODAMIX** (5) hoặc **ECO AMINOGRO** (6) với liều lượng 1 lít pha với 400 lít nước (2 phuy) nước phun hoặc tưới gốc, 5 lít/cây, 7 ngày phun hoặc tưới gốc 1 lần để giúp cây coi đọt.
- Sử dụng **CODAVIT** (7) với liều lượng 5 lít pha với 2000 lít nước (10 phuy)/ha, phun định kỳ 1 tháng 1 lần cùng với phân bón, để phòng nứt thân xì mủ do nấm Phytophthora spp. gây ra kiềm hãm sự phát triển của cây.



## Giai đoạn 3: LÀM BÔNG

- Khi cây đã đi đợt 2 coi đợt, coi thứ 2 khi lá đã mở hoàn toàn thì đến giai đoạn làm bông sâu riêng.
- Giai đoạn này cây cần hàm lượng Lân cao để giúp cho lá nhanh thành thực và kích thích các mầm ngủ ở trên cây để phân hóa mầm hoa và kích thích ra hoa.
- Sử dụng **BOOSTFERT GEL NPK 9-40-3** (1) + **BOOSTFERT NPK 20-20-15** (2) với liều lượng 50g/25 lít nước kết hợp với **CODAFOL K** (3) + **CODAMIN B-MO** (4) với liều lượng 5 lít pha với 2000 lít nước (10 phuy)/ha, phun đều ướt hết lá, phun 2 lần mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.
- Cần thường xuyên tưới **CODAVIT** (5) để tránh hiện tượng thui mắc cua (đen mầm hoa) khiến cây khó ra hoa.

**Lưu ý:** Ở giai đoạn này cần xiết nước trong vòng 10-15 ngày cây sẽ ra hoa, cần bổ sung **NUMASTAR** (6) để duy trì độ ẩm cho đất và cây hạn chế tình trạng ra hoa muộn. Sau đó tiếp tục phun để làm hoa.





## Giai đoạn 4: KÉO MẮT CUA (SỬ DỤNG PHÂN BÓN GỐC)

- Giai đoạn này cần các nguyên tố trung vi lượng để hình thành hạt phấn và chất lượng của hạt phấn.
- Giai đoạn này cần đi thêm một đợt cơ đợt nữa vì đợt cơ đợt này rất quan trọng cho quá trình nuôi trái về sau.
- Giai đoạn này thường kéo dài từ 30-45 ngày hoa bắt đầu xổ nhụy.
- Sử dụng **BOOSTFERT NPK 20-10-10** (1) rải gốc với liều lượng 2kg/cây chia ra 2 lần bón mỗi lần cách nhau 10-15 ngày.



# Giai đoạn 4: KÉO MẮT CUA (SỬ DỤNG PHÂN BÓN LÁ)

- Khi mắt cua được 3-5cm: sử dụng **CODAMIN B-MO** (1) + **ECO SEAWEED** (2) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước (4 phuy), phun 2 lần mỗi lần cách nhau 7 ngày.
- Sau khi phun lần thứ 2 khoảng 7 ngày: sử dụng **CODAMIN B-MO** (3) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước (4 phuy), phun 2 lần mỗi lần cách nhau 10 ngày, riêng lần cuối cùng sử dụng thêm **CODAFOL K** (4) với liều lượng 100g/25 lít nước phun thêm để giúp cơi đọt thứ 3 già nhanh tránh tình trạng cây xổ nhụy mà vẫn đi đọt sẽ làm rụng hoa, rụng trái non, giảm tỷ lệ đậu trái.
- Cần thường xuyên sử dụng **CODAMIX** (5) + **CODAVIT** (6) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng và phòng ngừa nấm bệnh cho cây.





## Giai đoạn 5: ĐẬU TRÁI

- Cây sẽ xoỉ rụng trong vòng 7-10 ngày, ở giai đoạn này không được sử dụng thuốc BVTV hoặc phân bón lá vì sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình thụ phấn của cây.
- Cần bổ sung trung vi lượng như Bo, Canxi,... để giúp cuống dai hơn, tránh tình trạng rụng trái non.
- Sử dụng **CODAMIN B-MO** (1) + **CODAFOL K** (2) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước phun 2 lần mỗi lần cách nhau 10 ngày.
- Cần thường xuyên sử dụng **CODAMIX** (3) + **CODAVIT** (4) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng và phòng ngừa nấm bệnh cho cây.



## Giai đoạn 6: NUÔI TRÁI

- Ở giai đoạn này cây cần dinh dưỡng cân bằng để tập trung nuôi trái.
- Bón gốc sử dụng **BOOSTFERT NPK 15-15-15** (1) bón 3 lần cách nhau 25-30 ngày.
- Bón lá sử dụng: **BOOSTFERT GEL NPK 10-5-27** (2) 1kg pha với 1000 lít nước **CODAFOL K** (3) + **CODAMIN B-MO** (4) với liều lượng 1 lít pha 720 lít nước (4 phuy), cách 15 ngày phun 1 lần đến khi trái to từ 3,5-4kg.
- Thường xuyên sử dụng **CODAMIX** (5) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước (4 phuy) để bổ sung vi lượng cho cây.





# Giai đoạn 7: 20 NGÀY TRƯỚC THU HOẠCH

- Giai đoạn này cây cần hàm lượng kali cao để giúp trái đẹp, bắt mắt và tăng độ ngọt cho trái.
- Bón gốc: sử dụng **SENTRA NPK 15-5-20+1,2Mg+TE** (1) hoặc **BOOSTFERT NPK 12-12-17** (2) với liều lượng 1,5kg/cây.
- Bón lá: sử dụng **BOOSTFERT GEL NPK 10-5-27** (3) liều lượng 1kg pha với 1000 lít nước **CODAFOL K** (4) + **CODASAL PREMIUM** (5) với liều lượng 1 lít pha 720 lít nước.
- Thường xuyên sử dụng **CODAVIT** (6) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để phòng ngừa nấm bệnh.





# Giai đoạn 8: RỬA VƯỜN VÀ PHỤC HỒI SAU THU HOẠCH

## 1. Giai đoạn rửa vườn:

- Sử dụng **CODAVIT** (1) với liều lượng 5 lít pha với 2000 lít nước (10 phuy)/ha phun ướt đều cây từ gốc tới ngọn.

## 2. Giai đoạn phục hồi sau thu hoạch:

- Ở giai đoạn này sau khi thu hoạch xong cây đang bị mất sức nên cần các nguyên tố đa lượng cao và hữu cơ để giúp cải thiện đất và dưỡng lại bộ rễ.

- Sau khi rửa vườn xong 7 ngày Bón gốc sử dụng **PHÂN HỮU CƠ** (2) với liều lượng 2kg/cây.

- Kết hợp pha **BOOSTFERT HUMIC K** (3) với liều lượng 1kg/ 1000 lít nước (5 phuy)+ **DALGIN Mg** (4) + **NUMASTAR** (5) với liều lượng 5 lít pha với 2000 lít nước (10 phuy)/ha, 7 ngày phun 1 lần.

**Lưu ý:** Giai đoạn này có thể sử dụng kết hợp thêm các thuốc BVTV.





## Giai đoạn 9: LÀM CƠ ĐỘT

- Giai đoạn này cây cần hàm lượng đạm cao để đi đọt, đi lá nhiều để chuẩn bị cho mùa tiếp theo.
- Bón gốc sử dụng: **BOOSTFERT NPK 20-10-10** (1) rải gốc với liều lượng 2kg/cây chia ra 2 lần bón cách nhau 20 ngày.
- Kết hợp pha **DALGIN Mg** (2) + **CODAMIX** (3) + **ECO AMINOGRO** (4) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước phun 5 lít/cây, 7 ngày phun 1 lần.

**Lưu ý:** Sầu riêng rất dễ bị bệnh nứt thân xì mủ nên trong quá trình trồng sầu riêng cần phun **CODAVIT** (5) để phòng ngừa.







# HỮU CƠ ÚC-CHÂU ÂU

## Tăng trưởng vượt trội

- ✓ Cải tạo đất, tăng hàm lượng mùn
- ✓ Cân bằng độ pH, rễ phát triển mạnh
- ✓ Tăng sức đề kháng cho cây trồng



(Khuyến cáo sử dụng cho tất cả các giai đoạn của cây trồng)





# BỘ SẢN PHẨM BOOSTFERT NPK CHO CÂY SẦU RIÊNG



(1) **BOOSTFERT GEL NPK 15-15-15**

Thúc đẩy tăng trưởng cây trồng



(2) **BOOSTFERT GEL NPK 9-40-3**

Tạo mầm hoa



(3) **BOOSTFERT GEL NPK 10-5-27**

Trái lớn - Màu sắc trái đẹp - Tăng độ ngọt



(4) **SENTRA NPK 15-5-20+1,2MG+TE**

To trái – Bóng trái – Tăng độ ngọt



(5) **BOOSTFERT NPK 15-15-15**

Thúc ra hoa - Tăng đậu trái - Trái lớn nhanh



(6) **BOOSTFERT NPK 20-10-10**

Phục hồi nhanh – Đâm chồi mạnh



(7) **BOOSTFERT NPK 12-12-17**

Tăng khả năng phân hóa mầm hoa



(8) **SENTRA NPK 30-9-9+TE**

Đi đọt mạnh – Đẻ nhánh nhiều



1

2

3



4



5



6



7



8



# BỘ SẢN PHẨM CODA CHO CÂY SẦU RIÊNG



## (1) **CODASAL PREMIUM**

Cải tạo đất – Chống nứt, thối trái



## (2) **DALGIN Mg**

Xanh lá – bền cây – Dai cuống



## (3) **CODAMIX**



Cung cấp vi lượng – Cải thiện hoa, đẹp trái



## (4) **CODAMIN B-MO**

Chống rụng bông, trái non – Giúp trái tròn đẹp



## (5) **CODAFOL K**

Lớn trái – Tăng độ ngọt – Màu sắc trái đẹp



## (6) **CODAVIT**



Siêu rửa vườn – Phòng ngừa nấm bệnh



## (7) **NUMASTAR**

Giải độc phèn mặn – Kích rễ nhanh mạnh



1

2

3

4

5

6

7

# BỘ NPK CỦA CÔNG TY SEN TRA CHO CÂY SẦU RIÊNG



(1) **SENTRA NPK 15-5-25+TE**

Nuôi trái lớn nhanh



(2) **BOOSTFERT NPK 17-17-17**

Bung chồi – Tạo mầm hoa – Tăng độ ngọt – Màu sắc trái đẹp



(3) **BOOSTFERT NPK 30-10-10**

Đâm chồi – Dày lá xanh mướt



(4) **BOOSTFERT NP 25-20**

Đi đọt mạnh – Đẻ nhánh nhiều



(5) **BOOSTFERT NPK 16-16-8**

Tăng đậu hoa - Nuôi trái



(6) **BOOSTFERT NPK 15-3-20**

Trái lớn – Tăng độ ngọt – Màu sắc trái đẹp



(7) **BOOSTFERT NPK 7-11-28**

Phát chồi – Ra hoa – Tăng độ ngọt trái



(8) **NPK 19-9-19**

Xanh lá – Lớn trái – Màu sắc trái đẹp



(9) **NPK 20-20-15**

Tăng trưởng mạnh – Chồi lá khỏe – Ra hoa nhiều



1

2

3

4

5

8

9



# BỘ PHÂN BÓN LÁ, TƯƠI GỐC, TƯƠI NHỎ GIỌT



(1) **BOOSTFERT HUMIC K**  
Rễ mạnh – Cây khỏe – Đất tươi xốp



(2) **BOOSTFERT FULVIC K**  
Cải tạo đất – Giải độc cho cây trồng  
– Kích rễ cực mạnh



(3) **ECO-SEAWEED**  
Kích thích rễ - Phát đợt - Phân hóa  
mầm hoa – Tăng đậu trái



(4) **ECO-AMINOGRO**  
Kéo đợt nhanh, mạnh



(5) **BOOSTFERT GEL NPK 9-40-3**  
Tạo mầm hoa



(6) **BOOSTFERT GEL NPK 15-15-15**  
Thúc đẩy tăng trưởng cây trồng



(7) **BOOSTFERT GEL NPK 10-5-27**  
Trái lớn - Màu sắc đẹp - Tăng độ ngọt



1



2



3



4



5

6

7