




QUY TRÌNH Bộ sản phẩm CODA

Trên cây Sầu riêng



Giai đoạn 1: **LÀM ĐẤT**

- Trước khi xuống giống 15-30 ngày cần làm đất để bổ sung chất dinh dưỡng và là tiền đề cơ bản để cây phát triển tốt hơn.
- Luân phiên sử dụng **CODASAL PREMIUM** (1) với liều lượng 5 lít pha với 2000 lít nước (10 phuy)/ ha giúp cải tạo đất, cung cấp dinh dưỡng cho đất và tạo môi trường tốt cho các vi sinh vật có lợi phát triển.



Giai đoạn 2: NĂM THỨ NHẤT, THỨ HAI, THỨ BA

- Ở các giai đoạn này, cây cần cung cấp hàm lượng đạm cao để phát triển cành nhánh, ra rễ nhiều.
- Tiếp tục tưới **CODASAL PREMIUM** (1) kèm phun **DALGIN MG** (2) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước (4 phuy) bổ sung dinh dưỡng giúp rễ khỏe, quang hợp, phát chồi, đẻ nhánh tốt.
- Phun kèm **CODAMIX** (3) + **CODAVIT** (4) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng và phòng ngừa nấm bệnh cho cây, đặc biệt là bệnh nứt thân xì mủ do nấm *Phytophthora* spp. gây kiềm hãm sự phát triển của cây.



Giai đoạn 3: LÀM BÔNG (XỬ LÝ RA HOA)

- Khi cây đã đi được 2 cơi đọt, cơi thứ 2 khi lá đã mở hoàn toàn thì đến giai đoạn làm bông sâu riêng.
- Giai đoạn này cây cần hàm lượng Lân cao để giúp cho lá nhanh thành thực và kích thích các mầm ngủ ở trên cây để phân hóa mầm hoa và kích thích ra hoa.
- Sử dụng **CODAFOL K** (1) với liều lượng 5 lít pha với 2000 lít nước (10 phuy)/ha, phun đều ướt hết lá, phun 2 lần mỗi lần cách nhau 7-10 ngày hỗ trợ sự hình thành của mầm hoa.
- Thường xuyên phun kèm **CODAMIX** (2) + **CODAVIT** (3) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng và phòng ngừa nấm bệnh cho cây, đặc biệt là bệnh nứt thân xì mủ do nấm *Phytophthora* spp., đốm mốc của hay thán thư,...

Lưu ý: Ở giai đoạn này cần xiết nước trong vòng 10-15 ngày cây sẽ ra hoa, cần bổ sung **NUMASTAR** (4) để duy trì độ ẩm cho đất và cây hạn chế tình trạng ra hoa muộn. Sau đó tiếp tục phun để làm hoa.



1

2

3

4



Giai đoạn 4: KÉO MẮT CUA

- Khi mắt cua được 3-5cm: sử dụng **CODAMIN B-MO** (1) + **DALIN Mg** (2) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước (4 phuy), phun 2 lần mỗi lần cách nhau 7 ngày. Sau đó tiếp tục phun cách nhau 10 ngày để giúp cơ đọt thứ 3 già nhanh tránh tình trạng cây xỏ nhụy mà vẫn đi đọt sẽ làm rụng hoa, rụng trái non, giảm tỷ lệ đậu trái sử dụng sau khi mắt cua hình thành, phun ướt đều mầm hoa và tán lá, sáng mắt cua, mập bông.
- Sử dụng **NUMASTAR** (3) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước sử dụng sau khi mắt cua hình thành, tưới quanh tán lá, sáng mắt cua, mập bông.
- Thường xuyên phun kèm **CODAMIX** (4) + **CODAVIT** (5) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng và phòng ngừa nấm bệnh cho cây, đặc biệt là bệnh nứt thân xì mũ do nấm *Phytophthora* spp., đốm mắt cua hay thán thư,...



Giai đoạn 5: ĐẬU TRÁI

- Cây sẽ xoổ ngứa trong vòng 7-10 ngày, ở giai đoạn này không được sử dụng thuốc BVTV vì sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình thụ phấn của cây.
- Tăng cường phun **CODAMIN B-MO** (1) + **CODAFOL K** (2) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước phun 2 lần mỗi lần cách nhau 10 ngày giúp hạn chế rụng bông sinh lý, tăng chất lượng hạt phấn là tiền đề cho trái tròn đẹp sau này.
- Thường xuyên phun kèm **CODAMIX** (3) + **CODAVIT** (4) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng và phòng ngừa nấm bệnh cho cây, đặc biệt là bệnh nứt thân xì mũ do nấm *Phytophthora* spp.



Giai đoạn 6: NUÔI TRÁI

- Ở giai đoạn này cây cần dinh dưỡng cân bằng để tập trung nuôi trái.
- Sử dụng **CODAMIN B-MO** (1) + **CODAFOL K** (2) với liều lượng 1 lít pha 720 lít nước (4 phuy), cách 15 ngày phun 1 lần đến khi trái to từ 3,5-4kg.
- Thường xuyên phun kèm **CODAMIX** (3) + **CODAVIT** (4) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng và phòng ngừa nấm bệnh cho cây.



Giai đoạn 7: 20 NGÀY TRƯỚC THU HOẠCH (VÀO CƠM)

- Giai đoạn này cây cần hàm lượng kali cao để giúp trái đẹp, bắt mắt và tăng độ ngọt cho trái và bổ sung canxi để phòng chống nứt trái, tăng thời gian bảo quản.
- Tăng cường phun **CODAFOL K** (1) + **CODASAL PREMIUM** (2) với liều lượng 1 lít pha 720 lít nước (4 phuy).
- Phun kèm **CODAMIX** (3) + **CODAVIT** (4) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng và phòng ngừa nấm bệnh cho cây.



Giai đoạn 8: RỬA VƯỜN VÀ PHỤC HỒI SAU THU HOẠCH

1. Giai đoạn rửa vườn:

- Sử dụng **CODAVIT** (1) với liều lượng 5 lít pha với 2000 lít nước (10 phuy)/ha phun ướt đều cây từ gốc tới ngọn.

2. Giai đoạn phục hồi sau thu hoạch:

- Ở giai đoạn này sau khi thu hoạch xong cây đang bị mất sức nên cần các nguyên tố đa lượng cao và hữu cơ để giúp cải thiện đất và dưỡng lại bộ rễ.
- Sau khi rửa vườn xong 7 ngày sử dụng **NUMASTAR** (2) + **DALGIN MG** (3) với liều lượng 5 lít pha với 2000 lít nước (10 phuy)/ha, 7 ngày phun 1 lần để phục hồi đất và cây sau thu hoạch.



Giai đoạn 9: LÀM CƠ ĐỘT

- Giai đoạn này cây cần hàm lượng đạm cao để đi đọt, đi lá nhiều để chuẩn bị cho mùa tiếp theo.
- Kết hợp pha **DALGIN Mg** (1) + **CODAMIX** (2) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước phun 5 lít/cây, 7 ngày phun 1 lần.

Khuyến cáo: Sử dụng **CODAVIT** (3) trong tất cả các giai đoạn của cây để phòng ngừa các loại nấm bệnh gây hại cho cây sầu riêng.

